



Biologische Untersuchungen im Märchenwald Einbeck

Website: [maerchenwald-einbeck.de](http://maerchenwald-einbeck.de)

**503 Käferarten erfasst von Ludger Schmidt, Neustadt a. Rbge.-Empede, und Dr. Reiner Theunert, Hohenhameln**

Wissenschaftliche Namen in schwarzer Schrift: 2013 nachgewiesen (L. Schmidt; *Leiosama cinnamomea*: Monika Köhler, vid. Kai Burgarth), teils auch in 2015-2017. Wissenschaftliche Namen in **roter Schrift**: nur in 2015-2017 nachgewiesen (R. Theunert; *Endomychus coccineus*: Henning Städtler; vid. R. Theunert).

EDV-Code	Wissenschaftlicher Name
<b>Carabidae / Laufkäfer (33 Arten)</b>	
01-.004-.001-.	<i>Carabus coriaceus</i> Linnaeus, 1758
01-.004-.003-.	<i>Carabus irregularis</i> Fabricius, 1792
01-.004-.0071.	<i>Carabus purpurascens</i> Fabricius, 1787
01-.004-.009-.	<i>Carabus auronitens</i> Fabricius, 1792
01-.004-.010-.	<i>Carabus problematicus</i> Herbst, 1786
01-.004-.026-.	<i>Carabus nemoralis</i> Müller, 1764
01-.005-.003-.	<i>Cychrus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)
01-.007-.006-.	<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)
01-.009-.008-.	<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1799)
01-.013-.001-.	<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)
01-.021-.007-.	<i>Trechus obtusus</i> Erichson, 1837
01-.029-.090-.	<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1761)
01-.0411.010-.	<i>Ophonus schaubergerianus</i> Puel, 1937
01-.0412.001-.	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (Degeer, 1774)
01-.045-.002-.	<i>Bradycellus verbasci</i> (Duftschmid, 1812)
01-.047-.001-.	<i>Anthracus consputus</i> (Duftschmid, 1812)
01-.050-.007-.	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)
01-.051-.011-.	<i>Pterostichus strenuus</i> (Panzer, 1797)
01-.051-.012-.	<i>Pterostichus diligens</i> (Sturm, 1824)
01-.051-.024-.	<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)
01-.051-.026-.	<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783)
01-.051-.030-.	<i>Pterostichus madidus</i> (Fabricius, 1775)
01-.051-.039-.	<i>Pterostichus burmeisteri</i> Heer, 1841
01-.052-.002-.	<i>Molops piceus</i> (Panzer, 1793)
01-.053-.002-.	<i>Abax parallelepipedus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)
01-.053-.004-.	<i>Abax parallelus</i> (Duftschmid, 1812)
01-.053-.005-.	<i>Abax ovalis</i> (Duftschmid, 1812)
01-.0631.003-.	<i>Limodromus assimilis</i> (Paykull, 1790)
01-.065-.009-.	<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)

01-.065-.021-.	<i>Amara aenea</i> (Degeer, 1774)
01-.065-.026-.	<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)
01-.070-.009-.	<i>Badister collaris</i> Motschulsky, 1844
01-.079-.012-.	<i>Dromius quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Dytiscidae / Schwimmkäfer (2 Arten)</b>	
04-.023-.007-.	<i>Agabus guttatus</i> (Paykull, 1798)
04-.023-.008-.	<i>Agabus melanarius</i> Aubé, 1836
<b>Hydrophilidae / Wasserfreunde (4 Arten)</b>	
09-.0011.022-.	<i>Helophorus flavipes</i> Fabricius, 1792
09-.003-.006-.	<i>Cercyon haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)
09-.004-.001-.	<i>Megasternum obscurum</i> (Marsham, 1802)
09-.005-.001-.	<i>Cryptopleurum minutum</i> (Fabricius, 1775)
<b>Histeridae / Stutzkäfer (13 Arten)</b>	
10-.002-.002-.	<i>Plegaderus vulneratus</i> (Panzer, 1797)
10-.002-.004-.	<i>Plegaderus dissectus</i> Erichson, 1839
10-.005-.001-.	<i>Abraeus granulum</i> Erichson, 1839
10-.005-.003-.	<i>Abraeus perpusillus</i> (Marsham, 1802)
10-.0071.001-.	<i>Aeletes atomarius</i> (Aubé, 1842)
10-.009-.002-.	<i>Gnathoncus nannetensis</i> (Marseul, 1862)
10-.009-.004-.	<i>Gnathoncus buyssoni</i> Auzat, 1917
10-.010-.005-.	<i>Saprinus semistriatus</i> (Scriba, 1790)
10-.020-.001-.	<i>Paromalus flavicornis</i> (Herbst, 1792)
10-.020-.002-.	<i>Paromalus parallelepipedus</i> (Herbst, 1792)
10-.029-.008-.	<i>Margarinotus striola</i> (Sahlberg, 1819)
10-.029-.011-.	<i>Margarinotus merdarius</i> (Hoffmann, 1803)
10-.029-.012-.	<i>Margarinotus brunneus</i> (Fabricius, 1775)
<b>Silphidae / Aaskäfer (8 Arten)</b>	
12-.001-.002-.	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)
12-.001-.005-.	<i>Nicrophorus fossor</i> Erichson, 1837
12-.001-.006-.	<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783
12-.001-.008-.	<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)
12-.002-.001-.	<i>Necrodes littoralis</i> (Linnaeus, 1758)
12-.003-.002-.	<i>Thanatophilus sinuatus</i> (Fabricius, 1775)
12-.004-.001-.	<i>Oiceoptoma thoracica</i> (Linnaeus, 1758)
12-.009-.001-.	<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Cholevidae / Nestkäfer (10 Arten)</b>	
14-.001-.003-.	<i>Ptomaphagus subvillosus</i> (Goeze, 1777)
14-.002-.001-.	<i>Nemadus colonoides</i> (Kraatz, 1851)

14-.005-.001-.	<i>Nargus velox</i> (Spence, 1815)
14-.010-.001-.	<i>Sciodrepoides watsoni</i> (Spence, 1815)
14-.011-.002-.	<i>Catops longulus</i> Kellner, 1846
14-.011-.007-.	<i>Catops tristis</i> (Panzer, 1793)
14-.011-.016-.	<i>Catops fuscus</i> (Panzer, 1794)
14-.011-.017-.	<i>Catops fuliginosus</i> Erichson, 1837
14-.011-.020-.	<i>Catops picipes</i> (Fabricius, 1792)
14-.0111.001-.	<i>Apocatops nigritus</i> (Erichson, 1837)
<b>Leiodiidae / Schwammkugelkäfer (13 Arten)</b>	
16-.002-.005-.	<i>Hydnobius punctatus</i> (Sturm, 1807)
16-.003-.013-.	<i>Leiodes cinnamomea</i> (Panzer, 1793)
16-.007-.001-.	<i>Anisotoma humeralis</i> (Fabricius, 1792)
16-.007-.003-.	<i>Anisotoma castanea</i> (Herbst, 1792)
16-.007-.005-.	<i>Anisotoma orbicularis</i> (Herbst, 1792)
16-.008-.001-.	<i>Liadopria serricornis</i> (Gyllenhal, 1813)
16-.011-.003-.	<i>Agathidium varians</i> (Beck, 1817)
16-.011-.006-.	<i>Agathidium mandibulare</i> Sturm, 1807
16-.011-.008-.	<i>Agathidium confusum</i> Brisont de Barneville, 1863
16-.011-.010-.	<i>Agathidium nigrinum</i> Sturm, 1807
16-.011-.013-.	<i>Agathidium nigripenne</i> (Fabricius, 1792)
16-.011-.014-.	<i>Agathidium atrum</i> (Paykull, 1798)
16-.011-.015-.	<i>Agathidium seminulum</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Scydmaenidae / Ameisenkäfer (8 Arten)</b>	
18-.004-.003-.	<i>Cephennium thoracicum</i> Müller & Kunze, 1822
18-.005-.001-.	<i>Neuraphes elongatulus</i> (Müller & Kunze, 1822)
18-.005-.005-.	<i>Neuraphes carinatus</i> (Mulsant, 1861)
18-.005-.012-.	<i>Neuraphes plicicollis</i> Reitter, 1879
18-.006-.003-.	<i>Scydmoraphes helvolus</i> (Schaum, 1844)
18-.007-.008-.	<i>Stenichnus collaris</i> (Müller & Kunze, 1822)
18-.007-.010-.	<i>Stenichnus bicolor</i> (Denny, 1825)
18-.008-.001-.	<i>Microscydms nanus</i> (Schaum, 1844)
<b>Ptilidae / Federflügler (1 Art)</b>	
21-.002-.008-.	<i>Ptenidium formicetorum</i> Kraatz, 1851
<b>Staphylinidae / Kurzflügelkäfer (98 Arten)</b>	
23-.0022.001-.	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790
23-.0023.001-.	<i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)
23-.005-.001-.	<i>Phloeocharis subtilissima</i> Mannerheim, 1830
23-.009-.001-.	<i>Proteinus ovalis</i> Stephens, 1834

23-.009-.004-.	<i>Proteinus brachypterus</i> (Fabricius, 1792)
23-.010-.021-.	<i>Eusphalerum semicoleoptratum</i> (Panzer, 1795)
23-.010-.033-.	<i>Eusphalerum atrum</i> (Heer, 1838)
23-.010-.034-.	<i>Eusphalerum tenenbaumi</i> (Bernhauer, 1932)
23-.011-.001-.	<i>Acrulia inflata</i> (Gyllenhal, 1813)
23-.014-.012-.	<i>Phyllodrepa ioptera</i> (Stephens, 1834)
23-.0141.001-.	<i>Hapalareaa pygmaea</i> (Paykull, 1800)
23-.015-.005-.	<i>Omalium rivulare</i> (Paykull, 1789)
23-.015-.018-.	<i>Omalium caesum</i> Gravenhorst, 1806
23-.016-.006-.	<i>Phloeonomus punctipennis</i> Thomson, 1867
23-.0161.001-.	<i>Xylostiba monilicornis</i> (Gyllenhal, 1810)
23-.0162.001-.	<i>Phloeostiba plana</i> (Paykull, 1792)
23-.0162.002-.	<i>Phloeostiba lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)
23-.023-.001-.	<i>Phyllodrepoidea crenata</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.025-.003-.	<i>Anthobium unicolor</i> (Marsham, 1802)
23-.032-.003-.	<i>Lesteva longoelytrata</i> (Goeze, 1777)
23-.037-.003-.	<i>Coryphium angusticolle</i> Stephens, 1834
23-.040-.001-.	<i>Syntomium aeneum</i> (Müller, 1821)
23-.041-.001-.	<i>Deleaster dichrous</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.042-.001-.	<i>Coprophilus striatulus</i> (Fabricius, 1792)
23-.0481.001-.	<i>Anotylus insecatus</i> (Gravenhorst, 1806)
23-.0481.003-.	<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775)
23-.0481.007-.	<i>Anotylus sculpturatus</i> (Gravenhorst, 1806)
23-.0481.011-.	<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.0481.022-.	<i>Anotylus tetracarınatus</i> (Block, 1799)
23-.055-.006-.	<i>Stenus fossulatus</i> Erichson, 1840
23-.055-.026-.	<i>Stenus bimaculatus</i> Gyllenhal, 1810
23-.055-.079-.	<i>Stenus pallitarsis</i> Stephens, 1833
23-.055-.107-.	<i>Stenus flavipalpis</i> Thomson, 1860
23-.067-.001-.	<i>Domene scabricollis</i> (Erichson, 1840)
23-.078-.001-.	<i>Nudobius lentus</i> (Gravenhorst, 1806)
23-.081-.001-.	<i>Atrecus affinis</i> (Paykull, 1789)
23-.082-.001-.	<i>Othius punctulatus</i> (Goeze, 1777)
23-.088-.006-.	<i>Philonthus subuliformis</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.088-.021-.	<i>Philonthus tenuicornis</i> Rey, 1853
23-.088-.023-.	<i>Philonthus cognatus</i> Stephens, 1832
23-.088-.026-.	<i>Philonthus succicola</i> Thomson, 1860
23-.088-.029-.	<i>Philonthus decorus</i> (Gravenhorst, 1802)

23-.088-.047-.	<i>Philonthus fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.090-.009-.	<i>Gabrius splendidulus</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.092-.001-.	<i>Ontholestes tessellatus</i> (Geoffroy, 1785)
23-.099-.009-.	<i>Ocypus megacephalus</i> (Nordmann, 1837)
23-.099-.020-.	<i>Ocypus compressus</i> (Marsham, 1802) = <i>Tasgius morsitans</i> (Rossi, 1790)
23-.103-.001-.	<i>Velleius dilatatus</i> (Fabricius, 1787)
23-.104-.013-.	<i>Quedius cruentus</i> (Olivier, 1795)
23-.104-.014-.	<i>Quedius brevicornis</i> Thomson, 1860
23-.104-.016-.	<i>Quedius mesomelinus</i> (Marsham, 1802)
23-.104-.020-.	<i>Quedius scitus</i> (Gravenhorst, 1806)
23-.104-.022-.	<i>Quedius cinctus</i> (Paykull, 1790)
23-.104-.048-.	<i>Quedius fumatus</i> (Stephens, 1833)
23-.104-.055-.	<i>Quedius lucidulus</i> Erichson, 1839
23-.107-.001-.	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Gravenhorst, 1806)
23-.109-.xxx-.	<i>Mycetoporus</i> spec. [Art?]
23-.1091.003-.	<i>Ischnosoma splendidum</i> (Gravenhorst, 1806)
23-.111-.006-.	<i>Lordithon trinotatus</i> (Erichson, 1839)
23-.111-.007-.	<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus, 1758)
23-.1111.001-.	<i>Carphacis striatus</i> (Olivier, 1794)
23-.113-.002-.	<i>Sepedophilus testaceus</i> (Fabricius, 1792)
23-.113-.005-.	<i>Sepedophilus bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.114-.002-.	<i>Tachyporus obtusus</i> (Linnaeus, 1767)
23-.114-.007-.	<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)
23-.117-.004-.	<i>Tachinus humeralis</i> Gravenhorst, 1802
23-.117-.006-.	<i>Tachinus subterraneus</i> (Linnaeus, 1758)
23-.117-.010-.	<i>Tachinus pallipes</i> Gravenhorst, 1806
23-.117-.013-.	<i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)
23-.126-.003-.	<i>Oligota granaria</i> Erichson, 1837
23-.1261.002-.	<i>Holobus apicatus</i> (Erichson, 1837)
23-.130-.025-.	<i>Gyrophaena boleti</i> (Linnaeus, 1758)
23-.1301.001-.	<i>Agaricochara latissima</i> (Stephens, 1832)
23-.132-.001-.	<i>Placusa complanata</i> Erichson, 1839
23-.132-.003-.	<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl, 1838)
23-.132-.006-.	<i>Placusa pumilio</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.133-.001-.	<i>Homalota plana</i> (Gyllenhal, 1810)
23-.141-.001-.	<i>Leptusa pulchella</i> (Mannerheim, 1830)
23-.141-.004-.	<i>Leptusa fumida</i> (Erichson, 1839)
23-.141-.006-.	<i>Leptusa ruficollis</i> (Erichson, 1839)

23-.142-.001-.	<i>Euryusa castanoptera</i> Kraatz, 1856
23-.147-.001-.	<i>Bolitochara obliqua</i> Erichson, 1837
23-.147-.004-.	<i>Bolitochara pulchra</i> (Gravenhorst, 1806)
23-.148-.002-.	<i>Autalia longicornis</i> Scheerpeltz, 1947
23-.188-.007-.	<i>Atheta luridipennis</i> (Mannerheim, 1830)
23-.188-.045-.	<i>Atheta nigricornis</i> (Thomson, 1852)
23-.188-.xxx-.	<i>Atheta confer fungi</i> [Art?]
23-.188-.168-.	<i>Atheta triangulum</i> (Kraatz, 1856)
23-.194-.001-.	<i>Thamiaraea cinnamomea</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.194-.002-.	<i>Thamiaraea hospita</i> (Märkel, 1844)
23-.201-.002-.	<i>Phloeopora opaca</i> Bernhauer, 1902
23-.201-.004-.	<i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830)
23-.201-.006-.	<i>Phloeopora corticalis</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.203-.003-.	<i>Ilyobates nigricollis</i> (Paykull, 1800)
23-.223-.034-.	<i>Oxypoda alternans</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.234-.002-.	<i>Haploglossa villosula</i> (Stephens, 1832)
23-.235-.001-.	<i>Tinotus morion</i> (Gravenhorst, 1802)
23-.237-.015-.	<i>Aleochara sparsa</i> Heer, 1839
<b>Pselaphidae / Palpenkäfer (7 Arten)</b>	
24-.002-.002-.	<i>Bibloporus bicolor</i> (Denny, 1825)
24-.002-.003-.	<i>Bibloporus minutus</i> Raffray, 1914
24-.006-.001-.	<i>Euplectus piceus</i> (Reichenbach, 1816)
24-.008-.006-.	<i>Plectophloeus nitidus</i> (Fairmaire, 1857)
24-.008-.009-.	<i>Plectophloeus fischeri</i> (Aubé, 1833)
24-.017-.002-.	<i>Bythinus burrelli</i> Denny, 1825
24-.018-.023-.	<i>Bryaxis curtisii</i> (Leach, 1817)
<b>Lycidae / Rotdeckenkäfer (2 Arten)</b>	
25-.004-.001-.	<i>Platycis minutus</i> (Fabricius, 1787)
25-.004-.002-.	<i>Platycis cosnardi</i> (Chevrolat, 1829)
<b>Lampyridae / Leuchtkäfer (1 Art)</b>	
26-.002-.001-.	<i>Lamprohiza splendidula</i> (Linnaeus, 1767)
<b>Cantharidae / Weichkäfer (11 Arten)</b>	
27-.002-.010-.	<i>Cantharis thoracica</i> (Olivier, 1790)
27-.002-.014-.	<i>Cantharis obscura</i> Linnaeus, 1758
27-.002-.018-.	<i>Cantharis nigricans</i> (Müller, 1776)
27-.002-.025-.	<i>Cantharis decipiens</i> Baudi, 1871
27-.002-.026-.	<i>Cantharis livida</i> Linnaeus, 1758
27-.003-.005-.	<i>Absidia rufotestacea</i> (Letzner, 1845)

27-.005-.005-.	<i>Rhagonycha testacea</i> (Linnaeus, 1758)
27-.005-.008-.	<i>Rhagonycha lignosa</i> (Müller, 1764)
27-.008-.001-.	<i>Malthinus punctatus</i> (Geoffroy, 1785)
27-.008-.009-.	<i>Malthinus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)
27-.009-.008-.	<i>Malthodes fibulatus</i> Kiesenwetter, 1852
<b>Malachiidae / Zipfelkäfer (1 Art)</b>	
29-.006-.0032.	<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Melyridae / Wollhaarkäfer (3 Arten)</b>	
30-.005-.005-.	<i>Dasytes cyaneus</i> (Fabricius, 1775)
30-.005-.008-.	<i>Dasytes plumbeus</i> (Müller, 1776)
30-.005-.009-.	<i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1830
<b>Phloiophilidae / Winterrindenkäfer (1 Art)</b>	
301.001-.001-.	<i>Phloiophilus edwardsii</i> Stephens, 1830
<b>Cleridae / Buntkäfer (2 Arten)</b>	
31-.002-.001-.	<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)
31-.007-.001-.	<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Lymexylonidae / Werftkäfer (2 Arten)</b>	
33-.001-.001-.	<i>Hylecoetus dermestoides</i> (Linnaeus, 1761)
33-.002-.001-.	<i>Lymexylon navale</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Elateridae / Schnellkäfer (17 Arten)</b>	
34-.001-.018-.	<i>Ampedus sanguinolentus</i> (Schrank, 1776)
34-.001-.019-.	<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)
34-.009-.001-.	<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)
34-.010-.002-.	<i>Agriotes pallidulus</i> (Illiger, 1807)
34-.010-.003-.	<i>Agriotes acuminatus</i> (Stephens, 1830)
34-.0101.001-.	<i>Ectinus aterrimus</i> (Linnaeus, 1761)
34-.015-.004-.	<i>Adrastus pallens</i> (Fabricius, 1792)
34-.016-.003-.	<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)
34-.026-.001-.	<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)
34-.030-.001-.	<i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)
34-.031-.001-.	<i>Hypoganus inunctus</i> (Panzer, 1795)
34-.033-.002-.	<i>Denticollis rubens</i> Piller & Mitterpacher, 1783
34-.033-.004-.	<i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)
34-.039-.001-.	<i>Hemicrepidius niger</i> (Linnaeus, 1758)
34-.041-.001-.	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)
34-.041-.002-.	<i>Athous vittatus</i> (Fabricius, 1792)
34-.041-.003-.	<i>Athous subfuscus</i> (Müller, 1767)
<b>Cerophytidae / Mulmkäfer (1 Art)</b>	

35-.001-.001-.	<i>Cerophytum elateroides</i> (Latreille, 1804)
<b>Eucnemidae / Schienenkäfer (5 Arten)</b>	
36-.001-.001-.	<i>Melasis buprestoides</i> (Linnaeus, 1761)
36-.003-.001-.	<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812
36-.008-.002-.	<i>Dirhagus lepidus</i> (Rosenhauer, 1847)
36-.011-.001-.	<i>Hylis olexai</i> Palm, 1955
36-.011-.003-.	<i>Hylis foveicollis</i> (Thomson, 1874)
<b>Throscidae / Hüpfkäfer (1 Art)</b>	
37-.001-.002-.	<i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1767)
<b>Buprestidae / Prachtkäfer (3 Arten)</b>	
38-.020-.003-.	<i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1777)
38-.020-.028-.	<i>Agrilus auricollis</i> Kiesenwetter, 1857
38-.025-.001-.	<i>Trachys minutus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Scirtidae / Sumpffieberkäfer (1 Art)</b>	
40-.004-.001-.	<i>Prionocyphon serricornis</i> (Müller, 1821)
<b>Dermestidae / Speckkäfer (3 Arten)</b>	
45-.006-.001-.	<i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)
45-.007-.001-.	<i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792)
45-.008-.010-.	<i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1761)
<b>Byrrhidae/ Pillenkäfer (1 Art)</b>	
47-.011-.002-.	<i>Byrrhus pilula</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Byturidae / Blütenfresser (1 Art)</b>	
49-.001-.001-.	<i>Byturus tomentosus</i> (Degeer, 1774)
<b>Cerylonidae / Glattrindenkäfer (3 Arten)</b>	
492.002-.001-.	<i>Cerylon fagi</i> Brisout, 1867
492.002-.002-.	<i>Cerylon histeroides</i> (Fabricius, 1792)
492.002-.003-.	<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830
<b>Nitidulidae / Glanzkäfer (22 Arten)</b>	
50-.006-.004-.	<i>Carpophilus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)
50-.008-.003-.	<i>Meligethes denticulatus</i> (Heer, 1841)
50-.008-.013-.	<i>Meligethes coeruleovirens</i> Förster, 1849
50-.008-.014-.	<i>Meligethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)
50-.009-.001-.	<i>Epuraea melanocephala</i> (Marsham, 1802)
50-.009-.015-.	<i>Epuraea marseuli</i> Reitter, 1872
50-.009-.016-.	<i>Epuraea pygmaea</i> (Gyllenhal, 1808)
50-.009-.027-.	<i>Epuraea unicolor</i> (Olivier, 1790)
50-.009-.028-.	<i>Epuraea variegata</i> (Herbst, 1793)
50-.009-.033-.	<i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758)



50-.009-.038-.	<i>Epuraea ocularis</i> Fairmaire, 1849
50-.010-.001-.	<i>Omosita depressa</i> (Linnaeus, 1758)
50-.013-.002-.	<i>Soronia grisea</i> (Linnaeus, 1758)
50-.015-.001-.	<i>Pocadius ferrugineus</i> (Fabricius, 1775)
50-.019-.002-.	<i>Cychramus luteus</i> (Fabricius, 1787)
50-.020-.001-.	<i>Cryptarcha strigata</i> (Fabricius, 1787)
50-.020-.002-.	<i>Cryptarcha undata</i> (Olivier, 1790)
50-.021-.001-.	<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1776)
50-.021-.002-.	<i>Glischrochilus hortensis</i> (Geoffroy, 1785)
50-.021-.0021.	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)
50-.021-.003-.	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)
50-.022-.001-.	<i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)
<b>Kateretidae / Riedglanzkäfer (1 Art)</b>	
501.003-.001-.	<i>Brachypterus urticae</i> (Fabricius, 1792)
<b>Monotomidae / Rindenglanzkäfer (9 Arten)</b>	
52-.001-.002-.	<i>Rhizophagus grandis</i> Gyllenhal, 1827
52-.001-.003-.	<i>Rhizophagus depressus</i> (Fabricius, 1792)
52-.001-.004-.	<i>Rhizophagus ferrugineus</i> (Paykull, 1800)
52-.001-.006-.	<i>Rhizophagus perforatus</i> Erichson, 1845
52-.001-.008-.	<i>Rhizophagus dispar</i> (Paykull, 1800)
52-.001-.009-.	<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)
52-.001-.010-.	<i>Rhizophagus nitidulus</i> (Fabricius, 1798)
52-.001-.012-.	<i>Rhizophagus parvulus</i> (Paykull, 1800)
52-.001-.013-.	<i>Rhizophagus cribratus</i> Gyllenhal, 1827
<b>Cucujidae / Plattkäfer (1 Art)</b>	
53-.015-.001-.	<i>Pediacus depressus</i> (Herbst, 1797)
<b>Silvanidae / Raubplattkäfer (4 Arten)</b>	
531.006-.001-.	<i>Silvanus bidentatus</i> (Fabricius, 1792)
531.006-.002-.	<i>Silvanus unidentatus</i> (Fabricius, 1792)
531.007-.001-.	<i>Silvanoprus fagi</i> (Guérin-Méneville, 1844)
531.011-.001-.	<i>Uleiota planata</i> (Linnaeus, 1761)
<b>Erotylidae / Pilzkäfer (1 Art)</b>	
54-.001-.001-.	<i>Tritoma bipustulata</i> Fabricius, 1775
<b>Biphyllidae / Buchenpilzkäfer (1 Art)</b>	
541.002-.001-.	<i>Diplocoelus fagi</i> (Chevrolat, 1837)
<b>Cryptophagidae / Schimmelkäfer (1 Art)</b>	
55-.014-.034-.	<i>Atomaria apicalis</i> Erichson, 1846
<b>Laemophloeidae / Halsplattkäfer (1 Art)</b>	

561.002-.001-.	<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)
<b>Lathridiidae / Schimmelkäfer (11 Arten)</b>	
58-.003-.0021.	<i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767)
58-.003-.0081.	<i>Latridius hirtus</i> (Gyllenhal, 1827)
58-.004-.010-.	<i>Enicmus fungicola</i> Thomson, 1868
58-.004-.012-.	<i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793)
58-.004-.013-.	<i>Enicmus testaceus</i> (Stephens, 1830)
58-.004-.014-.	<i>Enicmus transversus</i> (Olivier, 1790)
58-.0041.001-.	<i>Dienerella elongata</i> (Curtis, 1830)
58-.005-.0031.	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)
58-.0061.002-.	<i>Stephostethus angusticollis</i> (Gyllenhal, 1827)
58-.0061.006-.	<i>Stephostethus alternans</i> (Mannerheim, 1844)
58-.0081.001-.	<i>Corticicara gibbosa</i> (Herbst, 1793)
<b>Mycetophagidae / Baumschwammkäfer (6 Arten)</b>	
59-.002-.001-.	<i>Triphyllus bicolor</i> (Fabricius, 1792)
59-.003-.001-.	<i>Litargus connexus</i> (Geoffroy, 1785)
59-.004-.001-.	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1761)
59-.004-.003-.	<i>Mycetophagus piceus</i> (Fabricius, 1792)
59-.004-.006-.	<i>Mycetophagus atomarius</i> (Fabricius, 1792)
59-.004-.007-.	<i>Mycetophagus quadriguttatus</i> Müller, 1821
<b>Colydiidae / Rindenkäfer (2 Arten)</b>	
60-.013-.001-.	<i>Synchita humeralis</i> (Fabricius, 1792)
60-.014-.001-.	<i>Cicones variegatus</i> (Hellwig, 1792)
<b>Corylophidae / Faulholzkäfer (2 Arten)</b>	
601.004-.001-.	<i>Sericoderus lateralis</i> (Gyllenhal, 1827)
601.008-.008-.	<i>Orthoperus nigrescens</i> Stephens, 1828
<b>Endomychidae / Stäublingskäfer (1 Art)</b>	
61-.013-.001-.	<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Coccinellidae / Marienkäfer (10 Arten)</b>	
62-.006-.002-.	<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)
62-.012-.002-.	<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1850)
62-.023-.002-.	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)
62-.025-.003-.	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758
62-.028-.002-.	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
62-.031-.001-.	<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1767)
62-.031-.002-.	<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)
62-.032-.001-.	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)
62-.034-.001-.	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)

62-.035-.001-.	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Aspidiphoridae / Staubpilzkäfer (1 Art)</b>	
63-.002-.001-.	<i>Aspidiphorus orbiculatus</i> (Gyllenhal, 1808)
<b>Cisidae / Pilzkäfer (16 Arten)</b>	
65-.001-.001-.	<i>Octotemnus glabriculus</i> (Gyllenhal, 1827)
65-.003-.001-.	<i>Ropalodontus perforatus</i> (Gyllenhal, 1813)
65-.005-.001-.	<i>Sulcaxis affinis</i> (Gyllenhal, 1827)
65-.005-.003-.	<i>Sulcaxis fronticornis</i> (Panzer, 1809)
65-.006-.001-.	<i>Cis lineatocribratus</i> Mellié, 1848
65-.006-.002-.	<i>Cis nitidus</i> (Fabricius, 1792)
65-.006-.007-.	<i>Cis hispidus</i> (Paykull, 1798)
65-.006-.010-.	<i>Cis micans</i> (Fabricius, 1792)
65-.006-.011-.	<i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763)
65-.006-.013-.	<i>Cis punctulatus</i> Gyllenhal, 1827
65-.006-.015-.	<i>Cis castaneus</i> Mellié, 1848
65-.006-.017-.	<i>Cis bidentatus</i> (Olivier, 1790)
65-.0061.001-.	<i>Orthocis alni</i> (Gyllenhal, 1813)
65-.0061.007-.	<i>Orthocis vestitus</i> (Mellié, 1848)
65-.0061.008-.	<i>Orthocis festivus</i> (Panzer, 1793)
65-.007-.002-.	<i>Ennearthron cornutum</i> (Gyllenhal, 1827)
<b>Anobiidae / Pochkäfer (9 Arten)</b>	
68-.001-.002-.	<i>Hedobia imperialis</i> (Linnaeus, 1767)
68-.005-.001-.	<i>Xestobium plumbeum</i> (Illiger, 1801)
68-.012-.005-.	<i>Anobium costatum</i> Aragona, 1830
68-.012-.006-.	<i>Anobium fulvicorne</i> Sturm, 1837
68-.012-.012-.	<i>Anobium pertinax</i> (Linnaeus, 1758)
68-.014-.001-.	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)
68-.022-.003-.	<i>Dorcatoma chrysomelina</i> Sturm, 1837
68-.022-.006-.	<i>Dorcatoma dresdensis</i> Herbst, 1792
68-.022-.007-.	<i>Dorcatoma robusta</i> Strand, 1938
<b>Ptinidae / Diebskäfer (1 Art)</b>	
69-.008-.013-.	<i>Ptinus subpilosus</i> Sturm, 1837
<b>Oedemeridae / Scheinbockkäfer (2 Arten)</b>	
70-.007-.001-.	<i>Ischnomera sanguinicollis</i> (Fabricius, 1787)
70-.010-.010-.	<i>Oedemera virescens</i> (Linnaeus, 1767)
<b>Salpingidae / Scheinrüssler (3 Arten)</b>	
711.005-.001-.	<i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panzer, 1794)
711.006-.002-.	<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)

711.006-.003-.	<i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1761)
<b>Pyrochroidae / Feuerkäfer (3 Arten)</b>	
72-.001-.001-.	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1758)
72-.001-.002-.	<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)
72-.002-.001-.	<i>Schizotus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Scraptiidae / Seidenkäfer (4 Arten)</b>	
73-.004-.009-.	<i>Anaspis frontalis</i> (Linnaeus, 1758)
73-.004-.010-.	<i>Anaspis maculata</i> (Geoffroy, 1785)
73-.004-.019-.	<i>Anaspis rufilabris</i> (Gyllenhal, 1827)
73-.004-.022-.	<i>Anaspis flava</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Rhipiphoridae / Fächerkäfer (1 Art)</b>	
77-.003-.001-.	<i>Metoecus paradoxus</i> (Linnaeus, 1761)
<b>Mordellidae / Stachelkäfer (3 Arten)</b>	
79-.001-.001-.	<i>Tomoxia bucephala</i> Costa, 1854
79-.011-.053-.	<i>Mordellistena variegata</i> (Fabricius, 1798)
79-.012-.001-.	<i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775)
<b>Melandryidae / Düsterkäfer (6 Arten)</b>	
80-.005-.004-.	<i>Orchesia minor</i> Walker, 1837
80-.005-.006-.	<i>Orchesia undulata</i> Kraatz, 1853
80-.009-.002-.	<i>Phloiotrya rufipes</i> (Gyllenhal, 1810)
80-.013-.001-.	<i>Hypulus quercinus</i> (Quensel, 1790)
80-.016-.001-.	<i>Melandrya caraboides</i> (Linnaeus, 1761)
80-.018-.001-.	<i>Conopalpus testaceus</i> (Olivier, 1790)
<b>Tetratomidae / Keulendüsterkäfer (2 Arten)</b>	
801.001-.001-.	<i>Tetratoma fungorum</i> Fabricius, 1790
801.001-.003-.	<i>Tetratoma ancora</i> Fabricius, 1790
<b>Lagriidae / Wollkäfer (1 Art)</b>	
81-.001-.001-.	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Alleculidae / Pflanzenkäfer (1 Art)</b>	
82-.001-.002-.	<i>Allecula morio</i> (Fabricius, 1787)
<b>Tenebrionidae / Schwarzkäfer (3 Arten)</b>	
83-.014-.001-.	<i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)
83-.017-.001-.	<i>Diaperis boleti</i> (Linnaeus, 1758)
83-.023-.001-.	<i>Corticeus unicolor</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)
<b>Trogidae / Knochenkäfer (1 Art)</b>	
841.001-.004-.	<i>Trox scaber</i> (Linnaeus, 1767)
<b>Geotrupidae / Mistkäfer (2 Arten)</b>	
842.001-.001-.	<i>Odonteus armiger</i> (Scopoli, 1772)

842.005-.001-.	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)
<b>Scarabaeidae / Blatthornkäfer (8 Arten)</b>	
85-.019-.012-.	<i>Aphodius rufipes</i> (Linnaeus, 1758)
85-.019-.014-.	<i>Aphodius depressus</i> (Kugelann, 1792)
85-.019-.031-.	<i>Aphodius sticticus</i> (Panzer, 1798)
85-.019-.033-.	<i>Aphodius distinctus</i> (Müller, 1776)
85-.019-.044-.	<i>Aphodius prodromus</i> (Brahm, 1790)
85-.025-.001-.	<i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758)
85-.033-.002-.	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)
85-.045-.001-.	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1761)
<b>Lucanidae / Hirschkäfer (3 Arten)</b>	
86-.002-.001-.	<i>Dorcus parallelipedus</i> (Linnaeus, 1758)
86-.003-.002-.	<i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)
86-.005-.001-.	<i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Cerambycidae / Bockkäfer (24 Arten)</b>	
87-.004-.001-.	<i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)
87-.011-.003-.	<i>Rhagium mordax</i> (Degeer, 1775)
87-.011-.004-.	<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)
87-.015-.001-.	<i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)
87-.019-.001-.	<i>Gaurotes virginea</i> (Linnaeus, 1758)
87-.0201.001-.	<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)
87-.023-.002-.	<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)
87-.024-.001-.	<i>Alosterna tabacicolor</i> (Degger, 1775)
87-.027-.0031.	<i>Leptura quadrifasciata</i> (Linnaeus, 1758)
87-.027-.0041.	<i>Leptura maculata</i> (Poda, 1761)
87-.0271.002-.	<i>Anoplodera sexguttata</i> (Fabricius, 1775)
87-.0274.006-.	<i>Corymbia rubra</i> (Linnaeus, 1758)
87-.0274.009-.	<i>Corymbia scutellata</i> (Fabricius, 1781)
87-.0281.001-.	<i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)
87-.0293.001-.	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)
87-.039-.001-.	<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758)
87-.039-.002-.	<i>Molorchus umbellatarum</i> (Schreber, 1759)
87-.045-.001-.	<i>Aromia moschata</i> (Linnaeus, 1758)
87-.054-.001-.	<i>Pyrrhidium sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)
87-.058-.003-.	<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)
87-.063-.001-.	<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)
87-.082-.004-.	<i>Saperda scalaris</i> (Linnaeus, 1758)
87-.086-.008-.	<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)

87-.087-.001-.	<i>Tetrops praeustus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Chrysomelidae / Blattkäfer (19 Arten)</b>	
88-.004-.001-.	<i>Orsodacne cerasi</i> (Linnaeus, 1758)
88-.0061.003-.	<i>Oulema gallaeciana</i> (Heyden, 1870)
88-.0061.005-.	<i>Oulema melanopus</i> (Linnaeus, 1758)
88-.008-.001-.	<i>Lilioceris lili</i> (Scopoli, 1763)
88-.008-.002-.	<i>Lilioceris merdigera</i> (Linnaeus, 1758)
88-.023-.021-.	<i>Chrysolina purpurascens</i> (Germar, 1817)
88-.023-.023-.	<i>Chrysolina oricalcia</i> (Müller, 1776)
88-.023-.036-.	<i>Chrysolina varians</i> (Schaller, 1783)
88-.028-.002-.	<i>Gastrophysa viridula</i> (Degeer, 1775)
88-.035-.011-.	<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (Fabricius, 1787)
88-.049-.005-.	<i>Phyllotreta undulata</i> (Kutschera, 1860)
88-.051-.032-.	<i>Longitarsus suturellus</i> (Duftschmid, 1825)
88-.053-.002-.	<i>Hermaeophaga mercurialis</i> (Fabricius, 1792)
88-.059-.001-.	<i>Derocrepis rufipes</i> (Linnaeus, 1758)
88-.061-.003-.	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)
88-.062-.001-.	<i>Epitrix atropae</i> Foudras, 1860
88-.069-.003-.	<i>Apteropeda orbiculata</i> (Marsham, 1802)
88-.072-.007-.	<i>Psylliodes chrysocephalus</i> (Linnaeus, 1758)
88-.072-.010-.	<i>Psylliodes napi</i> (Fabricius, 1792)
<b>Anthribidae / Breitrüssler (2 Arten)</b>	
90-.001-.001-.	<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)
90-.010-.001-.	<i>Anthribus albinus</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Scolytidae / Borkenkäfer (17 Arten)</b>	
91-.004-.003-.	<i>Hylastes cunicularius</i> Erichson, 1836
91-.007-.001-.	<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)
91-.011-.001-.	<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius, 1787)
91-.012-.001-.	<i>Leperisinus fraxini</i> (Panzer, 1799)
91-.020-.002-.	<i>Crypturgus hispidulus</i> Thomson, 1870
91-.024-.001-.	<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)
91-.024-.002-.	<i>Dryocoetes villosus</i> (Fabricius, 1792)
91-.027-.001-.	<i>Ernoporicus fagi</i> (Fabricius, 1778)
91-.031-.003-.	<i>Taphrorychus bicolor</i> (Herbst, 1793)
91-.032-.001-.	<i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1758)
91-.036-.001-.	<i>Xyleborus dispar</i> (Fabricius, 1792)
91-.036-.004-.	<i>Xyleborus saxeseni</i> (Ratzeburg, 1837)
91-.036-.008	<i>Xyleborus germanus</i> (Blandford, 1894)

91-.0361.001-.	<i>Cyclorhipidion bodoanus</i> (Reitter, 1913)
91-.038-.001-.	<i>Xyloterus domesticus</i> (Linnaeus, 1758)
91-.038-.002-.	<i>Xyloterus signatus</i> (Fabricius, 1787)
91-.038-.003-.	<i>Xyloterus lineatus</i> (Olivier, 1795)
<b>Rhynchitidae / Blattroller und Triebstecher (3 Arten)</b>	
923-.006-.001-.	<i>Byctiscus betulae</i> (Linnaeus, 1758)
923.007-.001-.	<i>Deporaus tristis</i> (Fabricius, 1794)
923.007-.004-.	<i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758)
<b>Apionidae / Spitzmaulrüssler (3 Arten)</b>	
925.011-.001-.	<i>Kalcapion pallipes</i> (Kirby, 1808)
925.021-.002-.	<i>Protapion assimile</i> Kirby, 1808
925.034-.001-.	<i>Ischnopterapion loti</i> (Kirby, 1808)
<b>Curculionidae / Rüsselkäfer (36 Arten)</b>	
93-.015-.039-.	<i>Otiorhynchus niger</i> (Fabricius, 1775)
93-.015-.041-.	<i>Otiorhynchus fuscipes</i> (Olivier, 1807)
93-.021-.008-.	<i>Phyllobius oblongus</i> (Linnaeus, 1758)
93-.021-.015-.	<i>Phyllobius calcaratus</i> (Fabricius, 1792)
93-.021-.019-.	<i>Phyllobius argentatus</i> (Linnaeus, 1758)
93-.021-.021-.	<i>Phyllobius pyri</i> (Linnaeus, 1758)
93-.027-.007-.	<i>Polydrusus pterygomalis</i> Boheman, 1840
93-.027-.011-.	<i>Polydrusus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)
93-.027-.016-.	<i>Polydrusus undatus</i> (Fabricius, 1781)
93-.027-.023-.	<i>Polydrusus sericeus</i> (Schaller, 1783)
93-.029-.001-.	<i>Liophloeus tessulatus</i> (Müller, 1776)
93-.033-.001-.	<i>Sciaphilus asperatus</i> (Bonsdorff, 1785)
93-.037-.007-.	<i>Barypeithes araneiformis</i> (Schrank, 1781)
93-.040-.002-.	<i>Strophosoma melanogrammum</i> (Forster, 1771)
93-.040-.003-.	<i>Strophosoma capitatum</i> (Degeer, 1775)
93-.050-.004-.	<i>Tropiphorus elevatus</i> (Herbst, 1795)
93-.077-.003-.	<i>Cossonus linearis</i> (Fabricius, 1775)
93-.109-.006-.	<i>Bradybatus fallax</i> Gerstaecker, 1860
93-.110-.002-.	<i>Curculio venosus</i> (Gravenhorst, 1807)
93-.110-.006-.	<i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802
93-.110-.010-.	<i>Curculio salicivorus</i> Paykull, 1792
93-.110-.011-.	<i>Curculio pyrrhoceras</i> Marsham, 1802
93-.113-.001-.	<i>Trachodes hispidus</i> (Linnaeus, 1758)
93-.117-.001-.	<i>Leiosoma deflexum</i> (Panzer, 1795)
93-.135-.007-.	<i>Acalles camelus</i> (Fabricius, 1792)

93-.135-.017-.	<i>Acalles hypocrita</i> (Boheman, 1837)
93-.157-.003-.	<i>Coeliodes dryados</i> (Gmelin, 1790)
93-.163-.002-.	<i>Ceutorhynchus contractus</i> (Marsham, 1802)
93-.163-.035-.	<i>Ceutorhynchus alliariae</i> Brisout, 1860
93-.163-.040-.	<i>Ceutorhynchus obstrictus</i> (Marsham, 1802)
93-.169-.001-.	<i>Nedyus quadrimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)
93-.176-.001-.	<i>Cionus alauda</i> (Herbst, 1784)
93-.176-.002-.	<i>Cionus tuberculosus</i> (Scopoli, 1763)
93-.176-.004-.	<i>Cionus hortulanus</i> (Geoffroy, 1785)
93-.178-.001-.	<i>Stereonychus fraxini</i> (Degeer, 1775)
93-.180-.013-.	<i>Rhynchaenus fagi</i> (Linnaeus, 1758)